



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ταχ. δ/νση : Δημοκρατίας 1
ταχ. κώδικας : 69100, Κομοτηνή
πληροφορίες : Νίκος Κολάτσος
τηλέφωνα : 2531.3.50.408 (-410)
φαξ : 2531.3.50.483
E-mail : fytorod@pamth.gov.gr

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Κομοτηνή 22/9/2015

Αριθ.πρωτ...8366...

ΘΕΜΑ: «5ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2015»

1. Στόχος Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης σε συνεργασία με το Π.Κ.ΠΦ.Π.Ε. Καβάλας εκδίδει το 5ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων με στόχο την ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών της Π.Ε. Ροδόπης για καλύτερη καλλιεργητική διαχείριση και αποτελεσματική φυτοπροστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες.

2. Διαπιστώσεις. Η βαμβακοκαλλιέργεια στις πρώιμες αρδευόμενες περιοχές είναι αρχή ανοίγματος καρυδιών, και στις όψιμες στο στάδιο ωρίμανσης των καρυδιών. Από ότι φαίνεται οι καιρικές συνθήκες Αυγούστου και Σεπτεμβρίου (υψηλές θερμοκρασίες και ανομβρία) ευνόησαν την ανάπτυξη των φυτών και μείωσαν την οψιμότητα. Στις εστίες πράσινου σκουληκιού που διαπιστώθηκαν στις αρχές Αυγούστου έγιναν στις περισσότερες περιπτώσεις εντομοκτόνες επεμβάσεις.

3. Συστάσεις-Καλλιεργητικές πρακτικές. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης πιστεύει ότι το θέμα της φυτοπροστασίας του βαμβακιού έχει λήξει για φέτος. Από εδώ και στο εξής η μέριμνα των παραγωγών πρέπει να εστιαστεί στην σωστή ωρίμανση και αποφύλλωση, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες συγκομιδής και καλύτερη ποιότητα σύσπορου βαμβακιού απαλλαγμένου από ξένες ύλες.

Οι παραγωγοί έχουν δυνατότητες επιλογής χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση σκευάσματα που δρούν είτε σαν ωρίμαντικά ή είτε σαν αποφύλλωτικά ή συνδυάζοντας και τις δύο δράσεις μαζί.

Τα ωρίμαντικά (ethephon) επιταχύνουν τόσο την ωρίμανση όσο και την αποφύλλωση γιατί μετά την εφαρμογή τους απελευθερώνεται αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς το οποίο συμβάλλει τόσο στην ωρίμανση-άνοιγμα καρυδιών, όσο και στην αποφύλλωση. **Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα πρέπει μετά τον φεκασμό ωρίμαντικών να επικρατήσουν θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας μεγαλύτερες των 15°-18° για μια εβδομάδα, η σχετική εδαφική υγρασία να είναι χαμηλή και να επικρατεί καιρός με ηλιοφάνεια.** **Στις πρώιμες φυτείες** επαρκεί η χρήση τους καθώς τα καρύδια είναι αρκετά ωριμά και ανοιγμένα, οι θερμοκρασίες είναι ακόμη ευνοϊκές ($>15^{\circ}\text{C}$) και υπάρχει διαθέσιμος χρόνος.

Τα εγκεκριμένα **αποφυλλωτικά** σκευάσματα εμφανίζουν ισχυρή και ταχεία αποξηραντική δράση. Με βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών προτείνεται να εφαρμόζονται όταν έχει ανοίξει περισσότερο από το 60% των καρυδιών, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν ποιοτικές και ποσοτικές ζημιές. Προσοχή πρέπει να δοθεί και στην δοσολογία εφαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραγωγός θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος που θα χρησιμοποιούσει.

Ε.Π.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



Πίνακας Αποδεκτών

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,
Λ.Συγγρού 150,
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΘΗΝΑ
2. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας,
Αγ. Λουκάς-Τέρμα Αμυνταίου
65110 Καβάλα.
3. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας (για Μ.Μ.Ε.)
4. ΔΗΜΟΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
*(με την παράκληση να αναρτηθεί στους Οικισμούς με
βαμβακοκαλλιέργειες)*

Κοινοποίηση

1. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΑΜΘ
Ενταύθη

