



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ  
**ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. δ/ση.: Διοικητήριο, 661 00 ΔΡΑΜΑ

Πληροφ.: Κων/νος Σίμογλου

Τηλ.: 25213-51247

Φαξ: 25213-51204

Ηλ. ταχ.: simoglouk@pamth.gov.gr

Δράμα, 20-06-2017

Αρ. πρωτ.: 12089

**ΠΡΟΣ: 1) Φυτοφαρμακεία Π.Ε. Δράμας**

Ηλεκτρονική αποστολή

**2) Καλλιεργητές**

Ηλεκτρονική αποστολή

**ΚΟΙΝ.: 1) Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβάλας**

Άγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου

Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ

**2) Δήμοι Π.Ε. Δράμας**

Ηλεκτρονική αποστολή

**ΘΕΜΑ:** Διάκριση του εντόμου «διαβρώτικα» από τον «κρίοκερο» σε αραβόσιτο.

Υστερα από ερωτήματα καλλιεργητών αραβοσίτου προς την Υπηρεσία μας για προσβολές που έχουν αναφερθεί σε περιοχές της Π.Ε. Καβάλας από το έντομο «διαβρώτικα» (*Diabrotica virgifera*) σε καλαμπόκια, σάς ενημερώνουμε ότι:

**α)** Το έντομο «διαβρώτικα» παρακολουθείται ανελλιπώς από τη ΔΑΟΚ Δράμας στα πλαίσια των Γεωργικών Προειδοποιήσεων του ΥΠΑΑΤ και εκδίδονται Δελτία Προειδοποιήσεων σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας.

**β)** Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν έχουν καταγραφεί συλλήψεις του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων του νομού Δράμας, ούτε – πολύ περισσότερο – προσβολές από το έντομο αυτό σε καλλιέργειες αραβοσίτου του νομού.

**γ)** Αντίθετα, έχουν παρατηρηθεί προσβολές ενός άλλου εντόμου, του «κρίοκερου» (*Oulema melanopus*), σε καλαμπόκια σε ορισμένες περιοχές. Ο «κρίοκερος» βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης της γενιάς του. Τα ανήλικα στάδιά του (προνύμφες) αναπτύσσονται στα χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι) και στη συνέχεια εμφανίζονται τα ενήλικα που παρατηρούνται αυτή την εποχή στα καλαμπόκια. Το έντομο αυτό δεν είναι επικίνδυνο όσο είναι το «διαβρώτικα» για την καλλιέργεια. Όσον αφορά στο «διαβρώτικα» τα ανήλικα στάδιά του αναπτύσσονται στο ριζικό σύστημα του καλαμποκιού και όταν είναι σε μεγάλους αριθμούς προκαλούν πτώση των φυτών λόγω κακής στήριξης, τα οποία μετά επανέρχονται στην όρθια στάση προς το φως, δημιουργώντας το σύμπτωμα που ονομάζεται «λαιμός χήνας».

**δ)** Στις παρακάτω **φωτογραφίες** απεικονίζονται ενήλικα άτομα του «κρίοκερου» και του «διαβρώτικα» για λόγους ευκολίας στη διάκριση μεταξύ των δύο ειδών.

Παρακαλούμε να ενημερώνετε τους καλλιεργητές για τα παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρακαλούμε τους Δήμους Π.Ε. Δράμας να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο προς ενημέρωση των δημοτών τους, καλλιεργητών αραβοσίτου.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Φ.Ε.**

Σαρίγκολη Ιωάννα  
Γεωπόνος

## Φωτογραφίες για τη διάκριση του «διαβρώτικα» και του «κρίοκερου»

### «Κρίοκερος»



### «Διαβρώτικα»

