



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς

Τ. Κ. : 65404 Τ.Θ.: 1235

Τηλ. : 2510 600439-426-421.

Ε mail thgeorgiadou@minagric.gr

dimstou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις Δ.Α.Ο.Κ Α.Μ.Θ και τη Δ.Α..ΟΚ Σερρών.

No 28/21-07-2026

Πληροφορίες : Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου, Δ. Στουγιαννίδου.

ΑΜΠΕΛΙ

ΚΡΥΠΤΟΒΛΑΒΕΣ (*Cryptoblabes gnidiella*)

Το έντομο ***Cryptoblabes gnidiella*** (Lep.: Pyralidae) καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έτος 2024 να προσβάλλει βιολογικούς αμπελώνες στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Η καταγραφή έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ.Α.Ο.Κ Δράμας.

Το έντομο έχει πολλούς ξενιστές (αμπέλι, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα κ.α) με ιδιαίτερη προτίμηση στο αμπέλι. Οι νεαρές προνύμφες προσελκύονται από χυμούς σταφυλιών προσβεβλημένων από ευδεμίδα και ψευδόκοκκο καθώς και από σήψεις που προκαλούνται κατά την υποβάθμιση των ώριμων σταφυλιών. Λόγω των σακχάρων και του μελιτώματος (προσβολή από ψευδόκοκκο) που καταναλώνουν οι νεαρές προνύμφες τις καθιστά ταχύτερα αναπτυσσόμενες.

Η προσβολή αφορά και υγιείς βότρες (με επιφανειακές διαβρώσεις στους μίσχους) διαταράσσοντας έτσι το αγγειακό σύστημα με αποτέλεσμα την ξήρανση της ράγας.

Η εξάπλωση, το γενετικό υλικό καθώς και ο καθορισμός των γενεών του εντόμου διερευνάται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου υφίσταται η καλλιέργεια.

Σύμφωνα με έρευνες σε Ευρωπαϊκές χώρες, το έντομο έχει 3-4 γενεές. Η δεύτερη (2^η) γενεά, η οποία συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών, προκαλεί τις περισσότερες προσβολές. Η παρουσία του εντόμου σχετίζεται με ποικιλίες που συγκομίζονται αργά (όψιμες) και αποτελούν σημαντικότερο



παράγοντα προσβολών από ότι οι αυξημένοι πληθυσμοί του. Επιπλέον παράγοντας, στην αύξηση των προσβολών, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την περίοδο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από το δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκατασταθεί σταδιακά στις περιοχές αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, έχει καταγραφεί η έναρξη της πτήσης του εντόμου. Θα ακολουθήσει νεότερο σχετικό δελτίο με βάση την ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν από επιτόπιους ελέγχους.



© Τμήμα Πρασινάκη και Φυτοπροστασίας ΕΜΓγρ Αρδύης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ


Συνιστάται στους αμπελοκαλλιεργητές να ελέγχουν συστηματικά τους βότρες για πιθανή παρουσία όψιμης προσβολής από οποιοδήποτε λεπιδόπτερο. Ιδιαίτερα σε αμπελώνες όπου εφαρμόζεται η μέθοδος «Κομφούζιο» (παρεμπόδισης σύζευξης κατά της ευδεμίδας) και ταυτόχρονα δεν εφαρμόζεται καμία άλλη φυτοπροστατευτική επέμβαση για την αντιμετώπιση της.

Για την καταπολέμηση του εντόμου (*Cryptoblabes gnidiella*) και εφόσον συντρέχει λόγος (εκδήλωση προσβολής), συνιστάται η χρήση του ***Bacillus thuringiensis*** με χρήση προσκολλητικού σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές, τόσο στους βιολογικούς όσο και στους συμβατικούς αμπελώνες.

Η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, τη συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή όπως αναγράφεται στις ετικέτες. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευθούν για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

➤ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις , thgeorgiadou@minagric.gr, dimstou@minagric.gr

➤ Το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.



➤ Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου