



Τ.Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 65404 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600439 - 426
 E mail thgeorgiadou@minagric.gr
dimstou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ ΠΕ Ξάνθης

No 30/23-07-2026

Πληροφορίες : Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου, Δρ. Δήμητρα Στουγιαννίδου

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την πιπεριά ΠΥΡΑΛΙΔΑ (*Ostrinia nubilalis*)

Η πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), αν και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς του αραβοσίτου, προσβάλλει και την πιπεριά, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου συνυπάρχουν οι δύο καλλιέργειες.



Εικόνες 1, 2 (Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Ξάνθης)

Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ξάνθης, εγκατέστησε δύο (2) φερομονικές παγίδες στον Δήμο Τοπείρου (Ορφανό και Δασοχώρι), όπου παραδοσιακά καλλιεργείται η βιομηχανική πιπεριά, για την παρακολούθηση της πτήσης του εντόμου.

Επιπλέον, μία (1) παγίδα, τοποθετήθηκε σε καλλιέργεια αραβοσίτου στην περιοχή της Θαλασσιάς του ίδιου Δήμου. Η παρακολούθηση και η καταγραφή του πληθυσμού του εντόμου πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση από γεωπόνους της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ξάνθης. Η εγκατάσταση του δικτύου των παγίδων πραγματοποιήθηκε στις 09-06-2026. Η πρώτη καταγραφή

της πτήσης του εντόμου έγινε στα τέλη Ιουνίου στην καλλιέργεια του αραβοσίτου και στις αρχές Ιουλίου στην καλλιέργεια της πιπεριάς. Οι προνύμφες της δεύτερης γενεάς τρέφονται είτε από το στέλεχος είτε από τον καρπό της πιπεριάς.

Συμπτώματα προσβολής

- Δημιουργία οπών στο στέλεχος και παρουσία λεπτής σκόνης στην εξωτερική επιφάνεια του καρπού, όταν οι κάμπιες επιχειρούν να εισέλθουν στο εσωτερικό του. Συχνά παρατηρείται η παρουσία προνυμφών μέσα στον καρπό, κάτω από την επιδερμίδα.
- Πρόωρη ωρίμανση του καρπού, πτώση του και, στη συνέχεια, σήψη λόγω δευτερογενών προσβολών από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Συνέπεια των προσβολών είναι η σημαντική υποβάθμιση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.



Εικόνες 3, 4 (Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Ξάνθης)

Σύμφωνα με τις επιτόπιες παρατηρήσεις, η δεύτερη γενεά της πυραλίδας έχει ήδη ξεκινήσει. Η εμφάνισή της κατά το τρέχον έτος ήταν αρχικά χαμηλής έντασης, ωστόσο από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και μετά παρατηρείται μία αυξητική τάση του πληθυσμού.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η καλλιέργεια της πιπεριάς στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης επηρεάστηκε, μέχρι σήμερα, από μία σχετική καιρική αστάθεια. Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας καταγράφηκαν παρατεταμένες βροχοπτώσεις, ενώ στη συνέχεια επικράτησαν περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, κατά τόπους εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα, συνοδευόμενα από ισχυρές ανεμορριπές. Η επίδραση των ανωτέρω παραγόντων στην ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής θα εκτιμηθεί κατά τη συγκομιδή, με την προσδοκία ότι το τελικό παραγωγικό αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό.



Εικόνα 5 : ΔΑΟΚ Π.Ε. Ξάνθης 1

ΓΕΝΙΚΑ



Εικόνα 6 : ΔΑΟΚ Π.Ε. Ξάνθης 1

Οι παραγωγοί συνιστάται να παρακολουθούν συστηματικά τις καλλιέργειές τους και την εξέλιξη του πληθυσμού της πυραλίδας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία προνυμφών και συμπτωμάτων προσβολής στους καρπούς.

Εφόσον διαπιστωθούν προσβολές και κριθεί αναγκαία η επέμβαση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καλλιέργεια της πιπεριάς και σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους. Οι επεμβάσεις είναι αποτελεσματικότερες όταν πραγματοποιούνται στα κατάλληλα στάδια ανάπτυξης του καρπού (μέγεθος μεγαλύτερο του μισού του τελικού μεγέθους).



Εικόνα 7 : ΔΑΟΚ Π.Ε. Ξάνθης 1

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συγκομιδής.

Ο σωστός χρόνος και τρόπος εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και η πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης, συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλότερων ποιοτικών και ποσοτικών αποδόσεων της καλλιέργειας.

Η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικών γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, τη συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή όπως αναγράφεται στις ετικέτες. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευθούν για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.
<https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

- ✚ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις , thgeorgiadou@minagric.gr, dimstou@minagric.gr
- ✚ Το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου