



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς

Τ. Κ. : 65404 Τ.Θ.: 1235

Τηλ. : 2510 600439-426-421.

E mail thgeorgiadou@minagric.gr

dimstou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις Δ.Α.Ο.Κ Α.Μ.Θ και τη Δ.Α.Ο.Κ Σερρών.

No 33/19-08-2026

Πληροφορίες : Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου, Δ. Στουγιαννίδου.

ΑΜΠΕΛΙ

ΚΡΥΠΤΟΒΛΑΒΕΣ

(*Cryptoblabes gnidiella*)

(Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 28/21-07-2026 δελτίου)



© Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογέγονοματικού Ελέγχου Αγώνων

Το έντομο έχει 3-4 γενεές με πολλούς ξενιστές ,(αμπέλι-εσπεριδοειδή-πυρηνόκαρπα κ.α) και ιδιαίτερη προτίμηση στο αμπέλι. Η τρέχουσα γενεά, η οποία συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών την περίοδο που διανύουμε, είναι αυτή που αφορά κατά κύριο λόγο την αμπελοκαλλιέργεια επειδή μπορεί να προκαλέσει προσβολές στους βότρες .

Ράγες προσβεβλημένες από ευδεμίδα και ψευδόκοκκο καθώς και σήψεις που προκαλούνται κατά την υποβάθμιση των ώριμων σταφυλιών, προσελκύουν τις νεαρές προνύμφες.

Η προσβολή αφορά και υγιείς βότρες (με επιφανειακές διαβρώσεις στους μίσχους) διαταράσσοντας έτσι το αγγειακό

σύστημα με αποτέλεσμα την ξήρανση της ράγας.

Σημαντικότερο παράγοντα για τις προσβολές αποτελούν οι όψιμες ποικιλίες παρά οι αυξημένοι πληθυσμοί του εντόμου. Επιπλέον οι υψηλές θερμοκρασίες, συμβάλουν στην αύξηση του πληθυσμού.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Από το εγκατεστημένο δίκτυο φερομονικών παγίδων στις περιοχές αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, η πτήση του εντόμου συνεχίζεται με αυξητική τάση . Με βάση τα δεδομένα των συλλήψεων και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η καλλιέργεια συνιστάται:

- Οι αμπελοκαλλιεργητές να ελέγχουν συστηματικά τους βότρες για πιθανή παρουσία προσβολής από οποιοδήποτε λεπιδόπτερο, ιδιαίτερα στις όψιμες ποικιλίες.
- Αυξημένη προσοχή απαιτείται σε αμπελώνες όπου εφαρμόζεται η μέθοδος «Κομφούζιο» (παρεμπόδισης σύζευξης) κατά της ευδεμίδας και ταυτόχρονα δεν εφαρμόζεται καμία άλλη φυτοπροστατευτική επέμβαση για την αντιμετώπιση της.

Για την καταπολέμηση του εντόμου και εφόσον συντρέχει λόγος (εκδήλωση προσβολής), συνιστάται η χρήση του **Bacillus thuringiensis** με χρήση προσκολλητικού σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές, τόσο στους βιολογικούς όσο και στους συμβατικούς αμπελώνες.

Η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, τη συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή όπως αναγράφεται στις ετικέτες. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

- Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις , thgeorgiadou@minagric.gr, dimstou@minagric.gr
- Το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.



- Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου